



PA 9367 BPNEL

**Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.**

- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller farmaceut.
- Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad är CIALIS och vad används det för
2. Innan du tar CIALIS
3. Hur du tar CIALIS
4. Eventuella biverkningar
5. Förvaring av CIALIS
6. Övriga upplysningar

CIALIS 20 mg filmdragerade tabletter
tadalafil

Det aktiva innehållsämnet är tadalafil. Varje tablett innehåller 20 mg tadalafil.

Övriga innehållsämnen är:

Tablettkärna: laktosmonohydrat, kroskarmellosnatrium, hydroxipropylcellulosa, mikrokristallin cellulosa, natriumlaurilsulfat, magnesiumstearat.

Filmdragering: laktosmonohydrat, hypromellos, triacetin, titandioxid (E171), gul järnoxid (E172), talk.

Innehavare av godkännande för försäljning: Lilly ICOS Limited, St Bride's House, 10 Salisbury Square, London, EC4Y 8EH, Storbritannien.

Tillverkare: Eli Lilly and Company Ltd., Kingsclere Road, Basingstoke, Hampshire, RG21 6XA, Storbritannien.

1. VAD ÄR CIALIS OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR

CIALIS tabletter är gula och filmdragerade. De är mandelformade och är märkta "C 20" på ena sidan. Tabletterna tillhandahålls i tryckförpackning innehållande 2, 4, 8 eller 12 tabletter. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

CIALIS är en behandling för män med erektil dysfunktion. Detta innebär att en man inte kan få, eller bibehålla, en hård, erigerad penis, tillräcklig för sexuell umgänge.

CIALIS tillhör en grupp läkemedel som kallas fosfodiesteras typ 5-hämmare. CIALIS verkar vid sexuell stimulering genom att blodkärlen i penis slappnar av, så att blod kan strömma in. Detta resulterar i förbättrad erektil funktion. Om du inte har erektil dysfunktion hjälper inte CIALIS.

Det är viktigt att komma ihåg att CIALIS inte har någon effekt, om du inte är sexuell stimulerad. Behovet av förspel för dig och din partner är detsamma som när du inte har tagit något läkemedel för erektil dysfunktion.

2. INNAN DU TAR CIALIS**Ta inte CIALIS:**

- om du tar läkemedel som innehåller organiska nitrater eller kväveoxid-donatorer som t ex amylnitrit. Dessa läkemedel ("nitrater") används för att behandla kärlkramp (bröstsmärta). CIALIS har visat sig öka effekten av dessa läkemedel. Om du tar någon form av nitrat eller är osäker, skall du tala med din läkare.
- om du har en allvarlig hjärtsjukdom eller nyligen har haft en hjärtattack.
- om du nyligen har haft slaganfall (stroke).
- om du har lågt blodtryck eller okontrollerat högt blodtryck.
- om du är överkänslig (allergisk) mot tadalafil eller något av de andra innehållsämnen i CIALIS.

Var särskilt försiktig med CIALIS:

Sexuell umgänge utgör en möjlig risk för patienter med hjärtsjukdom, eftersom det anstränger hjärtat mer än vanligt. Om du har problem med hjärtat skall du tala om det för din läkare.

I det följande anges även några andra anledningar till att CIALIS kanske inte är lämpligt för dig. Om något av det följande stämmer in på dig, skall du tala med din läkare innan du tar läkemedlet.

- du har sicklecellanemi (onormala röda blodkroppar), multipelt myelom (cancer i benmärgen), leukemi (blodcellscancer) eller deformerad penis.
- du har allvarlig lever- eller njursjukdom.
- om du någon gång har haft en partiell, plötslig, tillfällig eller varaktig synnedgång eller synförlust på ett eller båda ögonen.

Intag av andra läkemedel:

Gör som regel att alltid tala om för din läkare om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana, eftersom de skulle kunna påverka varandra. Detta är särskilt viktigt om du behandlas med nitrater, eftersom du inte skall ta CIALIS om du behandlas med dessa läkemedel. En typ av läkemedel som kallas alfa-blockerare används ibland för att behandla högt blodtryck och förstörd prostata. Tala om för din läkare om du behandlas för något av dessa tillstånd. Om din läkare sagt till dig att inte ta CIALIS tillsammans med andra läkemedel skall du inte göra detta.

Du skall inte använda CIALIS samtidigt med någon annan behandling mot erektil dysfunktion.

CIALIS är inte avsett för användning av kvinnor eller barn under arton år.

Körförmåga och användning av maskiner:

Eftersom yrsel har rapporterats av män som tagit CIALIS i de kliniska studierna, bör du känna till hur du reagerar innan du kör bil eller använder maskiner.

Information till män som är laktosintoleranta:

CIALIS innehåller laktos och skall inte tas av patienter med sällsynta ärftliga sjukdomar som galaktosintolerans, Lapps laktasbrist eller bristande upptag av glukos-galaktos i tarmen.

3. HUR DU TAR CIALIS

Ta alltid CIALIS exakt enligt läkarens anvisningar. Rådfråga din läkare eller farmaceut om du är osäker.

Den rekommenderade dosen är en 10 mg tablett före sexuell aktivitet. Om effekten är för svag av denna dos kan läkaren öka dosen till 20 mg. CIALIS tabletter intas genom munnen. Svälj tablettens hel med lite vatten. Du kan ta CIALIS oberoende av måltid.

CIALIS kan tas ända fram till 30 minuter före sexuell aktivitet. Effekten av CIALIS kan kvarstå upp till 36 timmar efter tablettintag. Det är viktigt att komma ihåg att CIALIS inte har någon effekt, om du inte är sexuell stimulerad. Behovet av förspel för dig och din partner är detsamma som när du inte har tagit något läkemedel för erektil dysfunktion.

Alkoholintag kan påverka din förmåga att få erektion och kan tillfälligt sänka ditt blodtryck. Undvik intag av stora mängder alkohol (0,08 % eller mer i blodet) när du har tagit eller planerar att ta CIALIS eftersom detta kan öka risken för yrsel när man står upp.

Du skall INTE ta CIALIS mer än en gång per dag. Kontinuerlig, daglig användning i mer än några dagar rekommenderas ej eftersom säkerheten under längre tid inte har fastställts men även för att effekten av CIALIS vanligen kvarstår längre än ett dygn.

Om du tar mera CIALIS än vad du borde:

Kontakta din läkare.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan CIALIS ha biverkningar. Dessa är vanligen milda eller måttliga till sin natur.

De vanligaste biverkningarna är huvudvärk och matsmältningsbesvär. Mindre vanliga biverkningar är ryggsmärta, muskelvärk, nästäppa, ansiktsrodnad och yrsel. Ovanliga biverkningar är svullna ögonlock, smärta i ögonen och röda ögon.

Om du har någon av dessa biverkningar och de är besvärliga, svåra eller inte går tillbaka, tala om det för din läkare.

Allergiska reaktioner (inklusive hudutslag) kan förekomma.

I sällsynta fall kan förlängd och möjlig smärtfull erektion förekomma efter intag av CIALIS. Om du får erektion som varar längre än 4 timmar, skall du omedelbart kontakta din läkare.

Om du får bröstsmärta under eller efter sexuell umgänge skall du INTE ta nitrater utan omedelbart söka medicinsk vård.

Om du observerar en eller flera biverkningar, som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för din läkare eller farmaceut.

Hjärtattack, slaganfall och oregelbundna hjärtslag har rapporterats sällsynt hos män som intagit CIALIS. De flesta, men inte alla, hade kända problem med hjärtat innan de tog läkemedlet. Det är inte möjligt att avgöra om dessa reaktioner hade direkt samband med CIALIS.

Partiell, plötslig, tillfällig eller varaktig synnedgång eller synförlust på ett eller båda ögonen har rapporterats.

Hos ett djurslag har man observerat effekter som kan tyda på försämrad fertilitet. Senare studier på människa visar att sådana effekter är osannolika hos människa.

5. FÖRVARING AV CIALIS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras i originalförpackningen.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen eller blisterkartan.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos den nationella representanten för innehavaren av godkännandet för försäljning.

Belgique/België/Belgien

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Tel/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Česká republika

ELI LILLY -CR, s.r.o.

Tel: + 420 234 664 111

Danmark

Eli Lilly Danmark A/S

Tlf: + 45 45 26 60 00

Deutschland

Lilly Deutschland GmbH.

Tel. + 49-(0) 6172 273 2222

Eesti

Eli Lilly Holdings Limited

Eesti filiaal

Tel: + 372 6441100

Ελλάδα

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.

Τηλ: + 30 210 629 4600

España

Lilly S.A.

Tel: + 34-91 663 50 00

France

Lilly France SAS.

Tel: +33-(0) 1 55 49 34 34

Ireland

Eli Lilly and Company (Ireland) Limited.

Tel: + 353-(0) 1 661 4377

Ísland

Eli Lilly Danmark A/S, Útibú á Íslandi

Tel: + 354 520 3400

Italia

Eli Lilly Italia S.p.A.

Tel: + 39- 055 42571

Κύπρος

Phadisco Ltd

Τηλ: +357 22 715000

Latvija

Eli Lilly Holdings Limited pārštāvniecība

Latvija

Tel: +371 7364000

Lietuva

Eli Lilly Holdings Limited atstovybė

Tel. +370 (5) 2649600

Luxembourg/Luxemburg

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Magyarország

Lilly Hungária Kft

Tel: + 36 1 328 5100

Malta

Charles de Giorgio Ltd.

Tel: + 356 25600 500

Nederland

Eli Lilly Nederland B.V.

Tel: + 31-(0) 30 60 25 800

Norge

Eli Lilly Norge A.S.

Tlf: + 47 22 88 18 00

Österreich

Eli Lilly Ges. m.b.H.

Tel: + 43-(0) 1 711 780

Polska

Eli Lilly Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 (0) 22 440 33 00

Portugal

Lilly Portugal

Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tel: + 351-21-4126600

Slovenija

Eli Lilly, Podružnica Ljubljana.

Tel: +386 (0)1 580 00 10

Stovenská republika

Eli Lilly Slovakia, s.r.o.

Tel: + 421 (2) 59224 111

Suomi/Finland

Oy Eli Lilly Finland Ab.

Puh/Tel: + 358-(0) 9 85 45 250

Sverige

Eli Lilly Sweden AB.

Tel: + 46-(0) 8 737 88 00

United Kingdom

Eli Lilly and Company Limited.

Tel: + 44-(0) 1256 315999

Denna bipacksedel godkändes senast: november 2005.



Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen.

- Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen.
- Tämä lääke on määrätty sinulle henkilökohtaisesti eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun.

Tässä selosteessa esitetään:

1. Mitä Cialis on ja mihin sitä käytetään
2. Ennen kuin otat Cialis-tabletteja
3. Miten Cialis-tabletteja käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Cialis-tablettien säilyttäminen
6. Muuta tietoa

CIALIS 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen tadafafiili

Vaikuttava aine on tadafafiili. Yksi Cialis-tabletti sisältää 20 mg tadafafiilia.

Muut aineet ovat:

Tabletin ydin: laktoosimonohydraatti, kroskarmelloosinatrium, hydroksiopropyylliselluloosa, mikrokiteinen selluloosa, natriumlauryylisulfaatti, magnesiumstearaatti.

Kalvopäällyste: laktoosimonohydraatti, hypromelloosi, glyseroltriäsetaatti, titaanidioksidi (E 171), keltainen rautaoksididi (E 172), talkki.

Myyntiluvan haltija: Lilly ICOS Limited, St Bride's House, 10 Salisbury Square, London, EC4Y 8EH, Iso-Britannia.

Valmistaja: Eli Lilly and Company Ltd., Kingsclere Road, Basingstoke, Hampshire, RG21 6XA, Iso-Britannia.

1. MITÄ CIALIS ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

Cialis-tabletit ovat keltaisia, kalvopäällysteisiä ja mantelinmuotoisia. Niiden toisella puolella on merkintä "C 20". Tabletit ovat 2, 4, 8 tai 12 tabletin läpipainopakkauksissa. Kaikkia pakkauskoikoja ei välttämättä ole myynnissä.

Cialis on miesten erektiohäiriöiden hoitoon tarkoitettu lääke. Erektiohäiriöstä on kyse silloin, kun mies ei kykene saamaan riittävää erektiota tai ylläpitämään seksuaaliseen kanssakäymiseen riittävää erektiota.

Cialis kuuluu lääkeryhmään nimeltä fosfodiesteriäsi-tyyppi-5:n estäjät. Cialis toimii seksuaalisen stimulaation jälkeen rentouttamalla siittimen verisuonia ja edistämällä näin verenvirtausta siittimeen. Tästä seuraa parantunut erektio. Cialisesta ei ole apua, jos sinulla ei ole erektiohäiriötä.

On tärkeää muistaa, ettei Cialis tehoa ilman seksuaalista stimulaatiota. Sinun tulee harrastaa esileikkejä kumppanisi kanssa, aivan samoin kuin silloin, kun erektiohäiriölääkitystä ei käytetä.

2. ENNEN KUIN OTAT CIALIS-TABLETTEJA

Älä ota Cialisia

- Jos käytät jotakin orgaanista nitraattia tai typpioksidia vapauttavaa ainetta, kuten amyliintriittiä. Tämä on ryhmä ("nitraati"/"nitrot") rasisurintakivun hoitoon käytettyjä lääkkeitä. Cialisen on osoitettu tehostavan näiden lääkkeiden vaikutuksia. Jos käytät jotakin nitraattia tai olet epävarma asiasta, kerro siitä lääkärillesi
- jos sinulla on vakava sydänsairaus tai sinulla on ollut hiljattain sydänkohtaus
- jos sinulla on ollut hiljattain aivohalvaus
- jos verenpaineesi on alhainen tai hallitsemattomasti kohonnut
- jos olet yliherkkä (allerginen) tadafafiilille tai jollekin muulle Cialisen sisältämälle aineosalle.

Ole erityisen varovainen Cialisen suhteen:

Seksuaaliseen toimintaan liittyy sepelvaltimotauti- (sydänsairaus-) potilailla mahdollinen riski, koska se rasittaa sydäntä. Kerro lääkärillesi, jos sinulla on sydänvaivoja.

Cialis saattaa olla sinulle sopimaton myös seuraavien syiden vuoksi. Jos jokin näistä vaivoista koskee sinua, keskustele asiasta lääkärin kanssa ennen kuin otat lääkettä;

- sinulla on sirppisoluanemia (punasolujen poikkeavuus), multipple myelooma (luuytimen syöpä), leukemia (verisyöpä) tai siittimen epämuotoisuus
- sinulla on vaikea maksa- tai munuaisvaiva
- sinulla on joskus ilmennyt osittaista, äkillistä, ohimenevää tai pysyvää näön heikkenemistä tai häviämistä toisessa silmässä tai molemmissa silmissä.

Muiden lääkkeiden otto:

Kerro aina lääkärillesi, jos käytät parhaillaan tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös ilman reseptiä saatavia lääkkeitä, koska niillä saattaa toisinaan olla yhteisvaikutuksia. Tämä on erityisen tärkeää silloin, jos käytät nitraatteja ("nitrot", ks. edellinen kohta), koska et saa ottaa Cialis-tabletteja, jos käytät nitroryhmän lääkkeitä. Alfalpaajien-ryhmään kuuluvia lääkkeitä käytetään joskus korkean verenpaineen ja suurentuneen eturauhasen hoitoon. Kerro lääkärillesi, jos sinulla lääkitys jompaankumpaan näistä sairauksista. Älä ota Cialisia muiden lääkkeitteesi kanssa samanaikaisesti, jos lääkärisi on sen kieltänyt.

Cialisia ei pidä käyttää samanaikaisesti muiden erektiohäiriön hoitoon tarkoitettujen lääkkeiden kanssa.

Cialis ei ole tarkoitettu naisille eikä alle 18-vuotiaille.

Ajaminen ja koneiden käyttö:

Kliinisissä tutkimuksissa on raportoitu huimausta. Sinun tulee olla tietoinen siitä, kuinka reagoit Cialiskeen ennen kuin ajat autoa tai käytät koneita.

Tietoa laktoosi-intoleranssia sairastaville miehille:

Cialis sisältää laktoosia. Sitä ei tulisi käyttää potilaan, jolla on harvinainen perinnöllinen galaktoosi-intoleranssi, saamelaisilla esiintyvä laktaasipuutos (nk. "LAPP-hypolactasia") tai glukoosi-galaktoosi-imeytymishäiriö.

3. MITEN CIALIS-TABLETTEJA KÄYTETÄÄN

Käytä Cialisia lääkärisi antaman ohjeen mukaan. Mikäli olet epävarma jonkin asian suhteen, tarkista se lääkäriltäsi tai apteekistasi.

Suositusannos on yksi tabletti (10 mg) ennen seksuaalista kanssakäymistä. Lääkärisi voi määrätä sinulle 20 mg tabletin, jos 10 mg tabletin tehon ei katsota riittävän. Cialis-tabletti on tarkoitettu otettavaksi suun kautta. Niele tabletti kokonaisuena pienen vesimäärän kera. Cialisen voi ottaa tyhjään mahaan tai ruoan kanssa.

Voit ottaa Cialis-tabletin vähintään 30 minuuttia ennen seksuaalista kanssakäymistä. Cialis voi säilyttää tehonsa jopa 36 tuntia tabletin ottamisen jälkeen. On tärkeää huomata, että Cialisen vaikutuksen esilletuloon tarvitaan aina seksuaalinen kiihottuminen. Tarvitset esileikkejä partnerisi kanssa samalla tavalla kuin ilman erektiohäiriölääkitystäkin.

Alkoholin nauttiminen voi vaikuttaa kykyysi saada erektio. Alkoholin nauttiminen voi tilapäisesti laskea verenpainetta. Jos olet ottanut tai aiot ottaa Cialis-tabletin, vältä liiallista alkoholin juomista (veren alkoholipitoisuus 0,08%), koska se voi lisätä huimauksen vaaraa seisten.

Cialis-tabletin saa ottaa korkeintaan kerran päivässä. Cialisia ei pidä käyttää jatkuvasti päivittäin muutamaa päivää pitempään, koska sen turvallisuutta päivittäisessä pitkäaikaiskäytössä ei ole vahvistettu, ja myös koska Cialisen vaikutus kestää tavallisesti pitempään kuin yhden vuorokauden.

Jos otat enemmän Cialisia kuin sinun pitäisi:

Kerro siitä lääkärillesi.

4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikilla lääkkeillä, Cialisellakin voi olla haittavaikutuksia. Nämä vaikutukset ovat tavallisesti lieviä tai kohtalaisia.

Yleisimmin esiintyviä haittavaikutuksia ovat päänsärky ja ruoansulatusvaivat. Harvemmin ilmoitettuja haittavaikutuksia ovat selkäkkipu, lihaskivut, nenän tukkoisuus, kasvojen punoitus ja huimaus. Harvinaisia haittavaikutuksia ovat silmäluomien turvotus, silmäkipu ja silmien punoitus.

Jos sinulla ilmenee jotakin näistä haittavaikutuksista, ja ne ovat hankalia, vaikeita tai eivät häviä, kerro siitä lääkärillesi.

Allergisia reaktioita (mm. ihottumia) voi esiintyä.

Harvinaisissa tapauksissa on mahdollista, että Cialisen ottamisen jälkeen voisi esiintyä pitkittynyt ja mahdollisesti kivulias erektio. Jos sinulle tulee erektio, joka kestää yhtäjaksoisesti yli 4 tuntia, ota välittömästi yhteys lääkärilläsi.

Jos seksuaalisen toiminnan aikana tai sen jälkeen ilmenee rintakipua, ÄLÄ käytä nitraatteja ("nitrot"), vaan hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa, kerro niistä lääkärillesi tai apteekkiin.

Cialisen käytön yhteydessä harvoin raportoituja haittatapahtumia ovat sydänkohtaus, aivohalvaus ja epäsäännölliset sydämen lyönnit. Näitä haittatapahtumia saaneista miehistä useimmilla, mutta ei kaikilla, on ollut aikaisemmin tiedossa olevia sydänvaivoja. Ei ole mahdollista sanoa, ovatko nämä haittatapahtumat suoranaisesti yhteydessä Cialisen käyttöön.

Osittaista, äkillistä, ohimenevää tai pysyvää näön heikkenemistä tai häviämistä toisessa silmässä tai molemmissa silmissä on ilmoitettu.

Yhdellä eläinlajilla todettiin vaikutuksia, jotka voisivat viitata hedelmällisyyden heikkenemiseen. Jatkokatkimukset viittaavat kuitenkin siihen, että tämä vaikutus on epätodennäköinen ihmisillä.

5. CIALIS-TABLETTIEN SÄILYTTÄMINEN

Ei lasten ulottuville.

Säilytä alkuperäispakkauksessa.

Älä käytä pahvikotelossa ja läpipainopakkauksessa olevan viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.

6. MUUTA TIETOA

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja.

Belgique/België/Belgien

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.
Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Česká republika

ELI LILLY -ČR, s.r.o.
Tel: + 420 234 664 111

Danmark

Eli Lilly Danmark A/S
Tlf: + 45 45 26 60 00

Deutschland

Lilly Deutschland GmbH.
Tel. + 49-(0) 6172 273 2222

Eesti

Eli Lilly Holdings Limited
Eesti filiaal
Tel: + 372 6441100

Ελλάδα

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΑΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.
Τηλ: + 30 210 629 4600

España

Lilly S.A.
Tel: + 34-91 663 50 00

France

Lilly France SAS.
Tél: +33-(0) 1 55 49 34 34

Ireland

Eli Lilly and Company (Ireland) Limited.
Tel: + 353-(0) 1 661 4377

Ísland

Eli Lilly Danmark A/S, Útibú á Íslandi
Tel: + 354 520 3400

Italia

Eli Lilly Italia S.p.A.
Tel: + 39- 055 42571

Κίτιος

Phadisco Ltd
Τηλ: +357 22 715000

Latvija

Eli Lilly Holdings Limited pārstāvniecība
Latvijā
Tel: +371 7364000

Lietuva

Eli Lilly Holdings Limited atstovybė
Tel. +370 (5) 2649600

Luxembourg/Luxemburg

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.
Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Magyarország

Lilly Hungária Kft
Tel: + 36 1 328 5100

Malta

Charles de Giorgio Ltd.
Tel: + 356 25600 500

Nederland

Eli Lilly Nederland B.V.
Tel: + 31-(0) 30 60 25 800

Norge

Eli Lilly Norge A.S.
Tlf: + 47 22 88 18 00

Österreich

Eli Lilly Ges. m.b.H.
Tel: + 43-(0) 1 711 780

Polska

Eli Lilly Polska Sp. z o.o.
Tel.: +48 (0) 22 440 33 00

Portugal

Lilly Portugal
Produtos Farmacêuticos, Lda.
Tel: + 351-21-4126600

Slovenija

Eli Lilly, Podružnica Ljubljana.
Tel: +386 (0)1 580 00 10

Slovenská republika

Eli Lilly Slovakia, s.r.o.
Tel: + 421 (2) 59224 111

Suomi/Finland

Oy Eli Lilly Finland Ab.
Puh/Tel: + 358-(0) 9 85 45 250


Sverige






Eli Lilly Sweden AB.
Tel: + 46-(0) 8 737 88 00

United Kingdom

Eli Lilly and Company Limited.
Tel: + 44-(0) 1256 315999

Tämä seloste on hyväksytty viimeksi: marraskuu 2005.



CHECKS 1st 2nd			
	Literature Artwork Specification		
	Code:	PA 9367 BPNEL	Colours Used:
	Description:	Cialis 20mg - Northern Europe SW/FN	 Black
	Designed By:	Martine Codron	 PMS 143
	Date Sent:		 PMS 364
	Band No.:	25/34	 PMS 485
	Dimensions:	260 x 297	
	Spec:	LT0019	
	Film:	N/A	Fonts used:
	Proof Requirements:	NONE	Helvetica
	Proof No.:	1	UB-Helvetica
	Pharmacode:	116	Arial CE
	Comments:	Affiliate Proof 2 - 14/12/05	Olympus
		NAION, Address Panel	
<input type="checkbox"/> BLACK & WHITE <input type="checkbox"/> AMEND & PROCEED <input type="checkbox"/> PROOF ORDER <input type="checkbox"/> OK TO PRINT			PRINTING AT RISK <input type="checkbox"/> YES
SIGNED			DATE
SIGNED			DATE
AFFILIATE LABELLING RESPONSIBLE PERSON APPROVAL			
<input type="checkbox"/> APPROVED & PROCEED <input type="checkbox"/> APPROVED TO PRINT AT RISK			<input type="checkbox"/> PD CHECK SIGNATURE LOG
SIGNED			
PRINT NAME			DATE
QCW INSPECTED			
SIGNED			DATE
Sample to Affiliate <input type="checkbox"/>			Eli Lilly, Basingstoke

